2024학년도 3월 고1 전국연합학력평가 문제지

제 2 교시

수학 영역

5 지 선 다 형

1. $\sqrt{20} + \sqrt{5}$ 의 값은? [2점]

① $2\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{5}$ ③ $4\sqrt{5}$ ④ $5\sqrt{5}$ ⑤ $6\sqrt{5}$

3. 일차함수 y=ax의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프가 점 (2, 9)를 지날 때, 상수 a의 값은?

[2점]

1√6 ② 7

3 8 4 9


2. 일차방정식 $\frac{x}{2}$ +7=2x-8의 해는? [2점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8

 \checkmark_{10}

4. 그림과 같이 $\angle B = 90^{\circ}$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 3$, BC=2일 때, 선분 AC를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이는?

[3점]



① 11

② 12

⑤ 15

5. 다음은 어느 동호회 회원 15명의 나이를 줄기와 잎 그림으로 나타낸 것이다. 이 자료의 최빈값은? [3점]

(1|7은 17세)

줄기				힢	
1	7	8	9	9	
2	0	5	5	8	8
3	4	4	4	5	
4	1	6			

- ① 19세 ② 34세
- ② 25세 ⑤ 41세
- ③ 28세

- **6.** 다항식 (x+a)(x-3)을 전개한 식이 x^2+bx+6 일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [3점]
- **√**10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

7. 두 일차방정식

x-2y=7, 2x+y=-1

의 그래프의 교점의 좌표를 (a,b)라 할 때, a+b의 값은? [3점]

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 **⑤** -2

0=1. b=-9


12

8. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 각각의 주사위 에서 나오는 눈의 수의 차가 2 또는 4일 확률은? [3점]



 $2\frac{4}{9}$ $3\frac{5}{9}$ $4\frac{2}{3}$ $5\frac{7}{9}$

9. 그림과 같이 원 위의 세 점 A, B, C와 원 밖의 한 점 P에 대하여 직선 PA와 직선 PB는 원의 접선이고, ∠ACB=65°이다. 각 BPA의 크기는? [3점]



10. x에 대한 이차방정식 $(x-a)^2 = 27$ 의 두 근이 모두 양수가 되도록 하는 자연수 a의 최솟값은? [3점]

① 5

 \mathbf{V}_{6}

3 7 4 8 5 9

a- 127

11. 다음은 어느 학교의 학생 45명을 대상으로 한 달 동안의 독서 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다.

독서 시간(시간)	학생 수(명)	
0 ^{이상} ~ 5 ^{미만}	7	
5 ~ 10	11	
10 ~ 15	a	
15 ~ 20	10	
20 ~ 25	b	
합계	45	

이 도수분포표에서 독서 시간이 10시간 이상 15시간 미만인 계급의 상대도수가 0이 아닌 유한소수일 때, 2a+b의 값은? **8 &** [3

① 24



3 28

4 30

⑤ 32

[3점]

12. 두 밑변 AD, BC의 길이가 각각 $x^2 - 2x + 3$, $2x^2 + x + 6$ 이고 높이가 4인 사다리꼴 ABCD가 있다. 선분 CD의 중점을 E라할 때, 사각형 ABED의 넓이는? [3점]


① $3x^2 - x + 8$

② $3x^2 - x + 9$

 $4x^2 - 3x + 12$

 $4x^2 - 3x + 13$

 $5x^2 - 3x + 14$



2AD+BC

13. [그림 1]과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정육면체가 있다. 이 정육면체의 한 꼭짓점 A에서 만나는 세 모서리의 중점을 각각 B, C, D라 하자. 이 정육면체에서 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 하는 사면체를 잘라 내어 [그림 2]와 같은 입체도형을 만들었다. [그림 2]의 입체도형의 부피는? [3점]

·C [그림 1] [그림 2] $3 \frac{185}{3}$

14. 다음은 과수원 A의 사과 6개와 과수원 B의 사과 6개의 당도를 brix 단위로 측정한 결과에 대한 두 학생의 대화이다.

과수원 A의 사과 6개의 당도의 평균은 11이고 분산은 $\frac{5}{3}$ 야. 과수원 B의 사과는 어때?

과수원 B의 사과 6개 각각의 당도는 이므로 평균은 과수원 A의 사과 6개의 당도의 평균과 같고, 분산은 b가 되네. 그러니까 과수원 A의 사과 6개의 당도가 더 고르구나.

위 학생들의 대화를 만족시키는 두 상수 a, b에 대하여 a+b의 $\mathbf Q$ 값은? [4점]

- ① $\frac{37}{3}$ ② $\frac{40}{3}$ ④ $\frac{43}{3}$ ④ $\frac{46}{3}$

15. 두 온라인 서점 A, B에서 판매하는 정가가 12000원인 어느 도서의 할인율과 배송비는 표와 같다.

	온라인 서점 A	온라인 서점 B
도서 할인율	5%	10 %
배송비	0 원	4000 원

온라인 서점 A에서 이 도서를 한번에 x권 주문할 때 지불하는 금액이 온라인 서점 B에서 이 도서를 한번에 x권 주문할 때 지불하는 금액보다 더 크게 되도록 하는 x의 최솟값은? (단, 배송비는 한 번만 지불한다.) [4점]

① 5 ② 6


3/7

(4) 8


600 x > 4000

16. 그림과 같이 양수 a에 대하여 두 반비례 관계

 $y=rac{a}{x},\;y=-rac{2a}{x}$ 의 그래프가 직선 y=6과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 선분 OA, OB가 직선 y=3과 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ABDC의 넓이가 27일 때, a의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점] OAN=%



17. 그림과 같이 원점 O를 지나고 제4사분면 위의 점 A를 꼭짓점으로 하는 이차함수 y = f(x)의 그래프가 있다. 두 점 B(-5,0), C(0,-6)에 대하여 선분 AB와 선분 OC가 점 D에서 만난다. 삼각형 OCA의 넓이가 6이고, 삼각형 OBD의 넓이와 삼각형 DCA의 넓이가 같을 때, f(10)의 값은? (단, 점 D는 점 C가 아니다.) [4점]




를×10×6


18. 원 모양의 종이를 이용하여 그림과 같은 한복 저고리 모양과 한복 바지 모양을 만들 수 있다.



다음은 반지름의 길이가 4cm인 원 모양의 종이 두 장을 이용하여 한복 바지 모양을 만드는 과정이다.



두 점 D, F가 일치하도록 접는다.



Ⅰ, Ⅱ와 같은 방법으로 접은 🗌 모양의 종이 2개를 그림과 같이 직선 BC를 대칭축으로 하는 선대칭도형이 되도록 겹치지 않게 빈틈없이 붙인다.

위와 같은 방법으로 만든 💢 모양의 도형의 넓이는 $a \text{cm}^2$ 이다. a의 값은? (단, 종이의 두께는 고려하지 않는다.)

[4점]

① $6+6\pi+6\sqrt{2}$ $8+8\pi+8\sqrt{2}$ ② $8+6\pi+6\sqrt{2}$ $5 10 + 8\pi + 10\sqrt{2}$ $36+8\pi+8\sqrt{2}$

817 + 8 + 118

19. 한 변의 길이가 x(x>4)인 정사각형 ABCD에 대하여 선분 CD 위에 $\overline{CE} = 2$ 인 점 E와 선분 AD 위에 $\overline{FD} = 2$ 인 점 F가 있다. 선분 BC의 연장선 위에 $\overline{CG} = x - 2$ 인 점 G를 잡을 때, 삼각형 EGF의 넓이는 7이다. x의 값은? [4점]


① $2+2\sqrt{2}$




 $3 + 3\sqrt{2}$

 $4 + 3\sqrt{2}$

 $\bigcirc 3 + 4\sqrt{2}$



2(q-4) = 14 V-J = 3/2 20. 그림과 같이 한 변의 길이가 12인 정삼각형 ABC의 변 BC 위에 $\overline{DC} = 4$ 인 점 D가 있다. 선분 AD를 한 변으로 하는 정삼각형 ADE에 대하여 선분 AC와 선분 DE가 만나는 점을 F라 하자.



다음은 선분 CF의 길이를 구하는 과정이다.

두 정삼각형 ABC, ADE에서

$$\overline{AB} = \overline{AC}, \overline{AD} = \overline{AE}$$

이고.

$$\angle BAD = 60^{\circ} - \angle DAC = \angle CAE$$

이므로 삼각형 ABD와 삼각형 ACE는 서로 합동이다. 그러므로

$$\angle ECA = 60^{\circ}, \overline{CE} = \boxed{(1)}$$

이다.

한편 각 AFD와 각 CFE는 서로 맞꼭지각이고,

$$\angle DAF = \angle FEC$$

또한 $\angle ACD = \angle ECF$ 이므로 삼각형 ACD와 삼각형 ECF는 서로 닮은 도형이고,

삼각형 ACD와 삼각형 ECF의 닮음비는 (B):2이다. 따라서

이다.


위의 (7), (4), (4)에 알맞은 수를 각각 p, q, r이라 할 때, p+q+r의 값은? (단, 선분 AB와 선분 DE는 만나지 않는다.)

$$\sqrt{\frac{41}{3}}$$

$$^{3}\frac{4}{}$$

$$\sqrt[4]{\frac{41}{3}}$$
 2 14 3 $\frac{43}{3}$ 4 $\frac{44}{3}$ 5 15

21. 그림과 같이 AB= AC= 25 이고 BC= 40 인 이등변삼각형 ABC에 대하여 점 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 D라하자. 삼각형 ABC의 내심을 I, 삼각형 DBC의 내심을 J라 할때, 선분 IJ의 길이는? [4점]



なる

 $\textcircled{1} \ \frac{11\sqrt{10}}{9}$

 $4 \frac{14\sqrt{10}}{9}$

- $\sqrt[4]{\frac{4\sqrt{10}}{3}}$

r=8


300

 $3 \frac{13\sqrt{10}}{9}$

단 답 형

22. 이차함수 $y=x^2-2x+6$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 (a,b)일 때, a+b의 값을 구하시오. [3점]


23 \angle B=90 $^{\circ}$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{
m BC}$ =9, $\sin A=\frac{3}{5}$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오. [3점]



ka .


24, 두 자리의 자연수 m과 세 자리의 자연수 n에 대하여 $m \times n = 1265$ 일 때, m + n의 값을 구하시오. [3점]

26. 그림과 같이 한 변의 길이가 $4\sqrt{2}$ 인 정사각형 ABCD의 선분 AD 위에 $\overline{\rm DE} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 인 점 E가 있다. 정사각형 내부의 한 점 F에 대하여 \angle CFE = 90° 이고 $\overline{\rm EF}:\overline{\rm FC} = 4:7$ 이다. 정사각형 ABCD에서 사각형 EFCD를 잘라 내어 $\overline{}$ 모양의 도형을 만들었을 때, 이 도형의 둘레의 길이는 a이다. a^2 의 값을 구하시오. [4점]



$$\frac{1}{\sqrt{2}}(28411) = \frac{34}{\sqrt{2}}$$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}(28411) = \frac{34}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}(28411) = \frac{34}{\sqrt{2}}$

25. 그림과 같이 AB=AC, ∠A < 90°인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. 점 O에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 D라 하고, 직선 AO와 선분 BC의 교점을 E라 하자.
 AO=3OE이고 삼각형 ADO의 넓이가 6일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. [3점]




27. 네 수 $-\frac{1}{2}$, $\frac{6}{5}$, $-\frac{3}{4}$, $\frac{2}{9}$ 중 서로 다른 두 수를 곱하여 나올 수 있는 값으로 가장 큰 수를 a, 가장 작은 수를 b라 할 때, 120(a-b)의 값을 구하시오. [4점]

3 + 18 454108 = 147


28. 그림과 같이 $\overline{AB} = \sqrt{41}$, $\overline{BC} = 4$, $\angle C > 90$ °인 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자. 직선 AG와 선분 BC가 만나는 점을 D라 할 때, 삼각형 ADC의 넓이가 4이다.

 $\overline{\mathrm{DG}} imes an\left(\angle\mathrm{CDA}
ight) = rac{q}{p}$ 일 때, p+q의 값을 구하시오.

(단, *p*와 *q*는 서로소인 자연수이다.) [4점]




29. 그림과 같이 양수 a에 대하여 꼭짓점이 A(-3, -a)이고 점 B(1,0)을 지나는 이차함수 y=f(x)의 그래프와 꼭짓점이 C(3,3a)인 이차함수 y=g(x)의 그래프가 있다. 점 A 에서 x 축에 내린 수선의 발을 D라 할 때, 사각형 ABCD의 넓이는 16이다. 이차함수 y=g(x)의 그래프가 y 축과 만나는 점이 선분 CD 위에 있을 때, $f(-1)\times g(-3)$ 의 값을 구하시오. [4점]



$$-\frac{1}{8} \times 12 \times (3 - \frac{1}{3} \times 3 \times 9)$$

$$= \frac{3}{2} \times 6 = 9$$

30. 그림과 같이 $\overline{AB}=5\sqrt{5}$, $\overline{BC}=12$, $\angle CBA < 90$ °이고 넓이가 120인 평행사변형 ABCD가 있다. 선분 AD 위에 $\overline{AE}=3\overline{ED}$ 인 점 E를 잡고, 선분 CB의 연장선 위에 $\overline{BF}=\overline{ED}$ 인 점 F를 잡는다. 점 E를 지나고 직선 AB와 평행한 직선이 선분 DF와 만나는 점을 G라 할 때, $\sin(\angle AGF)=\frac{q}{p}\sqrt{85}$ 이다. p+q의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]



- * 확인 사항
- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기) 했는지 확인하시오.